

Граф логической структуры

Грибковые заболевания кожи

I. Нозологические единицы	Отрубевчатый лишай	Эриотризма	Трихофития	Микоспория	Фавус
II. Возбудители	<p><i>Pyroglyphum orbiculare</i></p>	<p><i>Sarobeobesitium</i></p>	<p><i>Tr. endothrix</i></p> <p><i>Tr. violaceum</i></p> <p><i>Tr. crateriforme</i></p>	<p><i>Tr. ectothrix</i></p> <p><i>Tr. raviforme</i></p> <p><i>Tr. fursum</i></p> <p><i>Micr. lanosum</i></p> <p><i>Micr. ferrugineum</i></p>	<p><i>Ach. schoenleinii</i></p>
III. Источники заражения	Человек	Человек	Человек	Крупный рогатый скот, Гризуны, Кошки	Человек
IV. Клинические проявления	Линейная сыпь на ладоней коже различного оттенка коричневого цвета; ставятся при сдвиге фавориты; ладоней ладоней	Резко ограниченные, слегка шелушащиеся пятна - лезвием скальпеля, чаще ладонные и подмышечные	Поверхностное поражение волосистой части головы; Поверхностное поражение лобной части; Поражение ногтей	Инфильтративно-нагноительное поражение волосистой части головы; Инфильтративно-нагноительное поражение лобной части; Поражение волосистой части головы; Поражение ногтей (редко)	Поражение волосистой части головы; Поражение лобной части; Поражение ногтей
V. Дифференциальная диагностика	Сифилистическая лейкодерма	Эпидермофития складок	Микроспория Фавус	Псориаз	Трихофития Фавус
VI. Лечение	Отшелушивающие фунгициды	Зонитрилом вульгаре 5% эритромициновая мазь	Фунгицидные средства Грибофунгил вульгаре	Наружно-фунгицидные средства При инфильтративно-нагноительном поражении фунгицидные после удаления волос; эритромициновая паста; эритромициновая мазь	Оксиды ла-Архатулу
VII. Организация борьбы	Изоляция больных и их лечение до полного излечения	Выявление истинных источников заражения	Обследование контактных	Проведение дезинфекции объектов и в очагах поражения	Снижение шток
			Парадические оспы; детские кожные заболевания	Наблюдение за паразитарными	
				Ветеринарный надзор за животными	
				Дезинфекция	
					Санирование помещений